Congruencias

Homero Gallegos
CONACyT – Unidad Académica de Matemáticas UAZ
h.r.gallegos.ruiz@gmail.com

11 de febrero de 2015

Cálculos en MAGMA:

```
> time Max(
SequenceToSet(Divisors(314159265358979323846264338))
meet
SequenceToSet(Divisors(271828182845904523536028747)));
13
Time: 0.050
> time GCD(314159265358979323846264338,
271828182845904523536028747);
13
Time: 0.000
```

División con residuo:

Teorema

Sean a y b enteros, con $a \neq 0$. Entonces existen enteros únicos r y q tales que

$$b = qa + r, \quad 0 \leq r < |a|$$

Congruencias:

Decimos que a y b son *congruentes módulo m* si $m \mid a - b$. Se escribe

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Ejemplos:

- Días de la semana
- Meses del año
- Horas del día
- $15 \equiv 1 \pmod{7}$ $10 \not\equiv 2 \pmod{3}$

Propiedades básicas:

- $a \equiv a \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$
- $a \equiv b \pmod{m}$ y $b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$

Representantes de las clases:

$$\{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$$

con el algoritmo de la división.

Más propiedades:

- Preservan sumas y productos:
Si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ y $ac \equiv bd \pmod{m}$.
- Si $d \mid m$ y $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $a \equiv b \pmod{d}$
- Si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $na \equiv nb \pmod{nm}$
- Si $ac \equiv bc \pmod{m}$, entonces $a \equiv b \pmod{\frac{m}{\text{mcd}(c,m)}}$

Cuidado con la última. $100 \equiv 60 \pmod{8}$ pero $10 \not\equiv 6 \pmod{8}$. Si $\text{mcd}(c, m) = 1$ sí se puede cancelar.

Inversos mód m :

Supongamos que $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces por Euclides extendido

$$ax + my = 1$$

y entonces $ax \equiv 1 \pmod{m}$.

En MAGMA usa

```
> XGCD(a,m)
```

para obtener $\text{mcd}(a, m), x, y$.

Nota: p primo, y $p \nmid a \Rightarrow \text{mcd}(a, p) = 1$. Luego todo elemento $\neq 0$ tiene inverso multiplicativo mód p .

Exponenciación mód m .

Sea n un entero positivo y $a_s \dots a_1 a_0$ su representación binaria. Por ejemplo, $n = 15$, $a_3 = a_2 = a_1 = a_0 = 1$. $15 = 1111_2$.

$$n = \sum a_i 2^i$$

Sea c otro entero. Usamos leyes de los exponentes para calcular:

$$c^n = c^{\sum a_i 2^i} = c^{a_s 2^s} \dots c^{a_2 2^2} \cdot c^{a_1 2} \cdot c^{a_0}.$$

Solo se requiere elevar al cuadrado sucesivamente para obtener las potencias:

$$c, c^2, (c^2)^2 = c^{2 \cdot 2} = c^{2^2}, (c^{2^2})^2 = c^{2^2 \cdot 2} = c^{2^3}, \dots$$

Calcula 13^{100} (mód 81).

Construimos una tabla

i	$\lfloor n/2^i \rfloor$	a_i	$c^{2^i} \text{ mód } m$
0	100	0	13
1	50	0	$13^2 = 169 \equiv 7$
2	25	1	$7^2 = 49$
3	12	0	$49^2 = 2401 \equiv 52$
4	6	0	$52^2 = 2704 \equiv 31$
5	3	1	$31^2 = 961 \equiv 70$
6	1	1	$70^2 = 4900 \equiv 40$

Entonces $13^{100} = 13^{2^2} 13^{2^5} 13^{2^6} \equiv 49 \cdot 70 \cdot 40 = 137200 \equiv 67$.

```
> n := 95468093486093450983409583409850934850938459083;  
> time 2^(n-1) mod n;
```

```
>> time 2^(n-1) mod n;  
      ^
```

```
Runtime error in '^': Argument 2 (95468093486093450983409583  
\  
82) is too large
```

```
>
```

En cambio,

```
> n := 95468093486093450983409583409850934850938459083;  
> time Modexp(2,n-1,n);  
34173444139265553870830266378598407069248687241  
Time: 0.000  
>
```

Pequeño teorema de Fermat:

Teorema

Sea p un número primo.

- Si a es un entero y $p \nmid a$, ($a \not\equiv 0 \pmod{p}$), entonces

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

- Si a es cualquier entero, entonces

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Aplicaciones:

- Decidir que un número no es primo. Si n es un entero y a es otro con $\text{mcd}(a, n) = 1$, y $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, entonces n no puede ser primo, sin necesidad de hallar factores.
- Calcular inversos. Si p es primo y $p \nmid a$, entonces $a^{p-2} \equiv a^{-1}$. Calcular potencias es fácil.

Demostración: Sea a un entero no divisible por p . Entonces $\text{mcd}(a, p) = 1$. Considera el conjunto

$$\{1, \dots, p - 1\}$$

y multiplica todo por a :

$$\{a, 2a, \dots, (p - 1)a\}.$$

Nota que en este nuevo conjunto, ningún número es divisible entre p . Además, si $ia \equiv ja \pmod{p}$, podemos multiplicar por un inverso de a para ver que $i \equiv j$. Es decir, no hay forma de que dos elementos diferentes del conjunto dejen el mismo residuo.

En otras palabras:

$$\{1, \dots, p-1\} \equiv \{a, 2a, \dots, (p-1)a\}.$$

Por las propiedades:

$$a^{p-1} 1 \cdot 2 \dots (p-1) \equiv 1 \cdot 2 \dots (p-1),$$

y como $1, \dots, p-1$ son cancelables, obtenemos

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

La segunda parte es fácil si $p \mid a$, y en otro caso, sólo multiplicamos por a .

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Teorema chino del residuo. (TCR)

Teorema

Sean m_1, m_2 enteros con $\text{mcd}(m_1, m_2) = 1$. Sean a_1, a_2 enteros.

El sistema de congruencias simultáneas:

$$t \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$t \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

tiene solución y es única módulo $m_1 \cdot m_2$.

Demostración (algoritmo):

Usa Euclides extendido:

$$1 = xm_1 + ym_2.$$

Multiplica por a_1 y reduce mód m_1 :

$$a_1 = a_1xm_1 + a_1ym_2 \equiv a_1ym_2 \pmod{m_1}.$$

Lo mismo con a_2 :

$$a_2 \equiv a_2xm_1 \pmod{m_2}.$$

Entonces

$$t = a_1ym_2 + a_2xm_1$$

es solución.

Si t' es otra solución, entonces $t' - t$ es divisible entre m_1 y m_2 .
Como $\text{mcd}(m_1, m_2) = 1$, entonces $m_1 \cdot m_2 \mid t' - t$. Es decir,

$$t' \equiv t \pmod{m_1 \cdot m_2}.$$

```
> m1:= 151; // Los modulos
> m2:= 878;
> GCD(m1,m2); // Checar condicion del mcd
1
> g,x,y:=XGCD(m1,m2); // Euclides extendido
> g;
1
> x;
157
> y;
-27
> a1:=10; // Valores ai
> a2:=87;
> t:= a1*y*m2 + a2*x*m1; // Formulita
1825449
> t mod (m1*m2); // Reduccion.
101935
```

MAGMA tiene la función CRT (Chinese Remainder Theorem)

```
> CRT([a1, a2], [m1, m2]);
```

```
101935
```

Teorema de Euler:

Para un entero mayor que 1 definimos:

$$\varphi(n) := \#\{0 \leq a < n \mid \text{mcd}(a, n) = 1\}.$$

Propiedades:

- Si p es primo: $\varphi(p) = p - 1$,
- Si p es primo y n positivo: $\varphi(p^n) = p^{n-1}(p - 1)$,
- Si m, n son tales que $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Las primeras dos son ejercicios fáciles de demostrar, la tercera es una aplicación del TCR y las propiedades de mcd.

Con estas propiedades, se puede calcular $\varphi(n)$ a partir de la factorización en primos de n . No se conoce un método para hacerlo sin la factorización.

Teorema de Euler

Teorema

Sea n un entero > 1 , y a un entero cualquiera tal que $\text{mcd}(a, n) = 1$. Entonces

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Es pues, una generalización del Pequeño teorema de Fermat, y se demuestra de una forma similar.

Teorema

Sea $n = pq$ un entero producto de dos números primos distintos p y q . Sean e, d enteros tales que $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.
($\varphi(n) = \varphi(pq) = \varphi(p)\varphi(q) = (p-1)(q-1)$) Entonces

$$a^{de} \equiv a \pmod{n}.$$

Demostración: Queremos ver que $n \mid a^{de} - a$. Como n es producto de primos distintos, basta ver que p y q dividen a $a^{de} - a$. Si $p \nmid a$, por el pequeño teorema de Fermat:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Notemos que $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ implica que $p-1 \mid ed-1$, y luego, existe un k tal que $(p-1)k = ed-1$ así que $1 \equiv (a^{p-1})^k = a^{(p-1)k} = a^{ed-1} \pmod{p}$.

Entonces

$$a^{ed} \equiv a \pmod{p}$$

Si $p \mid a$, entonces $a \equiv 0 \pmod{p}$ y luego $a^{ed} \equiv a \pmod{a}$.

Los mismos argumentos funcionan con q , así que tanto p como q dividen a $a^{ed} - a$, y por tanto $n = pq \mid a^{ed} - a$, es decir,

$$a^{ed} \equiv a \pmod{n}.$$