

Tarea núm. 7

(para el 6 oct, 2026)

Parte I: el grupo $\text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$.

Resolver 5 de los siguientes 8 problemas. Opcional: resolver todos.

1. Toda $f \in \text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$, $f \neq id$, tiene 1 o 2 puntos fijos en $\widehat{\mathbb{C}}$.

Sug. Usa que $\text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$ son las transformaciones de Möbius, $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$, $ad-bc \neq 0$.

2. Si $f_1, f_2 \in \text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$ son conjugadas, es decir, existe una $g \in \text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$ tal que $g \circ f_1 \circ g^{-1} = f_2$, entonces tienen el mismo número de puntos fijos; de hecho, z_1 es un punto fijo de f_1 ssi $z_2 := g(z_1)$ es un punto fijo de f_2 . Además, $f'_1(z_1) = f'_2(z_2)$.

Nota. Si ∞ es un punto fijo de una $f \in \text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$ se define $f'(\infty) := \tilde{f}'(0)$, donde $\tilde{f}(w) := 1/f(1/w)$.

3. Toda $f \in \text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$, $f \neq id$, es conjugada a (i) $z \mapsto z+c$, $c \neq 0$, o (ii) $z \mapsto cz$, $c \neq 0, 1$. Encuentra los puntos fijos en cada caso.

Resp. (i) ∞ , (ii) $0, \infty$.

Sug. Usa el teorema de Jordan: toda matriz compleja 2×2 es conjugada a una matriz de la forma (i) $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, o (ii) $\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$.

Definición. En caso (i) f se llama *parabólica*; en caso (ii) f se llama *elíptica* si $|c| = 1$, e *hiperbólica* si $|c| \neq 1$ (o *loxodrómica*, en algunos textos).

4. Si f es parabólica, con punto fijo z_0 , entonces $f'(z_0) = 1$ y

$$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} f^n(z) = z_0$$

para todo $z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{z_0\}$.

Nota. Para $n > 0$, f^n significa f compuesta con su misma n veces y $f^{-n} := (f^{-1})^n$.

5. Si f es elíptica o hiperbólica, con puntos fijos $z_{\pm}$, entonces $f'(z_+)f'(z_-) = 1$.
6. Si f es elíptica, con puntos fijos $z_{\pm}$, entonces $|f'(z_+)| = |f'(z_-)| = 1$.
7. Si f es hiperbólica, con puntos fijos $z_{\pm}$, entonces $|f'(z_{\pm})| \neq 1$. Si $|f'(z_+)| < 1 < |f'(z_-)|$ entonces

$$\lim_{n \rightarrow \pm\infty} f^n(z) = z_{\pm}$$

para todo $z \in \widehat{\mathbb{C}} \setminus \{z_+, z_-\}$.

Sug. En problemas 4-7, usando 2-3, basta considerar los casos (i)-(ii) del 3.

8. Usamos el isomorfismo $\text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}}) \cong \text{SL}_2(\mathbb{C})/\{I, -I\}$ para definir una topología en $\text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$. Demuestra que en esta topología la unión de las transformaciones elípticas e hiperbólicas es un subconjunto abierto y denso en $\text{Aut}(\widehat{\mathbb{C}})$.

Sug. $A \in \text{SL}_2(\mathbb{C})$ determina una transformación de Möbius parabólica o la identidad ssi $\text{tr}(A) = \pm 2$.

Parte II. Resolver 2 de los siguientes 5 problemas. Opcional: resolver todo.

9. Demuestra que $f(z) = -\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$ define un biholomorfismo $D \cap H \rightarrow H$, donde $D := \{|z| < 1\}$, $H := \{\text{Im}(z) > 0\}$.

Sug. La ecuación $f(z) = w$ se reduce a la ecuación cuadrática $z^2 + 2wz + 1 = 0$, con dos raíces distintas cuando $w \neq \pm 1$.

10. Sea $f : H \rightarrow D$ holomorfa con $f(i) = 0$. Demuestra que

$$|f(z)| \leq \left| \frac{z-i}{z+i} \right|$$

para todo $z \in H$.

Sug. Usar el Lemma de Schwarz.

11. Sea $f : D \rightarrow D$ holomorfa. Entonces para todo $z \in D$

$$\left| \frac{f(z) - f(0)}{1 - \overline{f(0)}f(z)} \right| \leq |z|.$$

Sug. Usar el Lemma de Schwarz.

12. Si $f : D \rightarrow D$ es holomorfa con dos puntos fijos entonces $f = id$.

Sug. Si 0 es un punto fijo usa el Lemma de Schwarz. Si $z_0 \neq 0$ es un punto fijo existe una $g \in \text{Aut}(D)$ tal que $g(z_0) = 0$; luego 0 es un punto fijo de $g \circ f \circ g^{-1}$.

13. Cierto o Falso: toda función holomorfa $f : D \rightarrow D$ tiene un punto fijo.