

# Modelos Estocásticos I

## Problemas 9

Los problemas 1, 4, 6 y 8 son para entregar el martes 5/10/10

1. Considere una cadena de Markov sobre  $\{0, 1, 2, \dots\}$  tal que a partir del estado  $i$ , la cadena va a  $i + 1$  con probabilidad  $p$ ,  $0 < p < 1$ , y va al estado 0 con probabilidad  $1 - p$ .
  - a) Demuestre que esta cadena es irreducible.
  - b) Calcule  $P_0(T_0 = n)$ ,  $n \geq 1$ .
  - c) Demuestre que la cadena es recurrente.
2. Un sistema puede estar en cuatro estados, 1, 2, 3 y 4. Si el sistema está en el estado  $j$ ,  $j < 4$ , en el siguiente paso se mueve al estado  $j + 1$ . Desde el estado 4, el sistema pasa a 2 o a 3 con probabilidad  $1/2$  en cada caso. Halle la matriz de transición. Clasifique los estados y calcule la matriz de transición en  $n$  pasos para  $N = 2$  y  $n = 16$ .
3. Determine las clases de equivalencia, los estados transitorios, los estados recurrentes y los conjuntos cerrados para las cadenas con las siguientes matrices de transición:

$$a) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \quad b) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

4. Determine las clases de equivalencia y clasifique los estados en transitorios o recurrentes para una cadena de Markov con las siguientes matrices de transición. Determine también los subconjuntos cerrados e irreducibles del espacio de estados.

$$a) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad b) \begin{pmatrix} 0.4 & 0.5 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0.3 & 0.2 & 0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. Considere una cadena de Markov con espacio de estados  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  y matriz de transición

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- a) Determine las clases de equivalencia. ¿Cuáles son cerradas?
  - b) Determine cuáles estados son transitorios y cuáles recurrentes.
  - c) Halle  $\rho_{0j}$  para  $j = 0, 1, \dots, 6$ .
6. Determine las clases de equivalencia y clasifique los estados de la cadena de Markov con las siguientes matrices de transición

$$a) \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0.4 \\ 0.3 & 0 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad b) \begin{pmatrix} 0.8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0 & 0.9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0.7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0.4 & 0.4 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad d) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.4 & 0 & 0 & 0.1 & 0 & 0.1 & 0.2 \\ 0 & 0 & 0.3 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0.3 \end{pmatrix}$$

7. Sean  $Y_1, Y_2, \dots$  v.a.i.i.d. con valores en  $\{0, 1, 2, 3, 4\}$  con distribución común  $(p_0, p_1, p_2, p_3, p_4)$ . Sea  $X_0 = 0$  y definimos

$$X_{n+1} = X_n + Y_{n+1} \quad (\text{módulo } 5).$$

Demuestre que  $X_n$  es una cadena de Markov. Halle su espacio de estados y su matriz de transición. Observe que en esta matriz cada columna suma 1. Este tipo de matrices se conoce como *doblemente aleatorias*. *Observación:* Para  $x, y \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ , la suma módulo  $n$  se define como

$$x + y \text{ (módulo } n) = \begin{cases} x + y, & \text{si } x + y < n, \\ x + y - n & \text{si } x + y \geq n \end{cases}$$

8. Definimos el instante de la  $k$ -ésima visita al estado  $j$  por

$$T_j^k = \min\{n > T_j^{k-1} : X_n = j\}$$

para  $k \geq 1$  y ponemos  $T_j^0 = 0$ . Con esta definición  $T_j^1$  coincide con  $T_j$ , como fue definido en clases. Demuestre que para  $k \geq 1$ ,  $P_i(T_j^k < \infty) = \rho_{ij}\rho_{jj}^{k-1}$ .

9. Con las definiciones vistas en clase, demuestre que

$$P_{ij}^n = \sum_{m=1}^n P_i(T_j = m) P_{jj}^{n-m},$$

para  $n \geq 1$ . Demuestre que si  $a$  es un estado absorbente,  $P_{ia}^n = P_i(T_a \leq n)$ , para  $n \geq 1$ .

10. a) Demuestre que  $\rho_{ij} > 0$  si y sólo si  $P_{ij}^n > 0$  para algún entero positivo  $n$ .  
 b) Demuestre que si  $P_{ij} = 0$  siempre que  $i \in C$ ,  $j \notin C$ , entonces  $C$  es cerrado.
11. Decimos que una v. a.  $T$  es un *tiempo de parada* para el proceso  $(X_n)_{n \geq 1}$  si, para cada  $n$ , es posible determinar si el suceso  $\{T = n\}$  ocurrió o no observando los valores del proceso hasta el tiempo  $n$ :  $X_0, X_1, \dots, X_n$ .
- a) Sea  $i$  un estado cualquiera de la cadena. Demuestre que  $T_i$ , el instante de la primera visita a  $i$ , es un tiempo de parada pero  $\tau_i$ , el instante de la última visita a  $i$ , no lo es.
- b) Demuestre la siguiente propiedad (que es una versión de la Propiedad Fuerte de Markov)

$$P(X_{T+1} = j | X_k = i_k \text{ para } 0 \leq k < T, X_T = i) = P(X_{T+1} = j | X_T = i).$$